



بولتن خبری

اخبار منتشر شده از دکتر حمیدرضا دهقان منشادی

بریده جراید و آلبوم انتشار اخبار به مورخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

دسترسی سریع به بخش‌های مختلف بولتن خبری

با کلیک بر روی هر یک از گزینه‌ها به بخش مورد نظر وارد شوید

متن خبر
آلبوم روزنامه‌ها ۳مورد
آلبوم خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ۲۲ مورد
آلبوم صوتی و تصویری ۲ مورد
پیکان بازگشت

تمامی صفحات بولتن، دارای بک لینک برای اتصال و ورود به منبع اصلی درج خبر می‌باشند.

اجراء ؛ شرکت ایده پردازان خبر ماندگار (ایپیکام)

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.

به گزارش انجمن کلینیکال آنکولوژی، دکتر حمیدرضا دهقان منشادی متخصص رادیوتراپی آنکولوژی با بیان این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: قبل از هر چیز میزان مصرف دخانیات است که این شانس را تغییر می‌دهد، و نسبت مصرف سیگار ((pack/year، بر اساس تعداد سال‌های مصرف به تعداد پاکت‌های سیگاری که یک فرد در روز مصرف می‌کند محاسبه می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان داشت: اگر فرد به مدت ۱۰ سال روزی یک پاکت سیگار مصرف کرده باشد این نسبت به صورت ۱۰ بسته بر سال تعریف می‌شود، هرچقدر این عدد افزایش پیدا کند شانس ابتلا به سرطان هم بیشتر می‌شود. که با پایین آمدن سن مصرف دخانیات به‌ویژه سیگار، این نگرانی وجود دارد که تعداد افراد بیشتری در ادامه عمر خود به شاخص ۱۰ بسته بر سال در مصرف سیگار برسند، در این شرایط دور از انتظار نیست که ابتلا به سرطان در کشور طی سال‌های آینده افزایش پیدا کند.

دهقان منشادی در خصوص وضعیت ابتلا به سرطان در کشور نسبت به دیگر کشورها و تاثیر مصرف دخانیات بر آن گفت: بروز سرطان‌های مختلف در کشور ما کمتر از کشورهای پیشرفته است، اما سرعت رشد سرطان در کشور با توجه به جمعیت، بیشتر از کشورهای پیشرفته است و نکته مهم این است که جمعیت ما در حال سالمند شدن است و احتمال بروز سرطان در جمعیت کهنسال بیشتر بوده و طبیعتاً مصرف سیگار این میزان را افزایش می‌دهد.

وی با اعلام اینکه سرطان ریه اولین سرطان شایعی است که مستقیماً به مصرف سیگار ربط داشته و حدود ۷۵ درصد مبتلایان به سرطان ریه سابقه مصرف سیگار دارند، گفت: سرطان حنجره دومین سرطان شایع مرتبط با مصرف سیگار است، و ۷۰ درصد کسانی که به این سرطان مبتلا شدند سابقه مصرف سیگار داشته و مبتلایان به سرطان زبان و دهان تا حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد سابقه مصرف سیگار یا شبه دخانیات را دارند، همچنین مبتلایان به سرطان معده و مثانه تا ۵۰ درصد سابقه مصرف سیگار در آنها مشاهده شده است.

دکتر دهقان ادامه داد و گفت: موارد کمتر شایع ابتلا به سرطان‌های مری و کولورکتال است، سرطان‌های دهانه رحم و پوست هم می‌توانند مرتبط با مصرف سیگار باشند اما میزان ارتباط آن‌ها با دخانیات معمولاً کمتر از ۳۰ درصد است. البته سرطان‌های خون مثل CLL و CML هم میزان بالایی ارتباط با مصرف سیگار و دخانیات دارند. با این وجود می‌شود گفت اگر مجموع این سرطان‌ها را در نظر بگیریم می‌توانیم متوجه شویم در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، با اشاره به این موضوع که قطع مصرف سیگار می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان را کاهش دهد بیان داشت: اگر فردی مصرف سیگار را ترک کند، اگرچه همچنان سوابق مصرف در بیمار شدن فرد موثر است، اما مطالعات اخیر نشان داده یک بهبودی در تاثیر این سوابق برای بیمار نشدن افراد بوجود می‌آید. یعنی اگر کسی ۱۰ سال متوالی سیگار کشیده باشد، چنانچه ۱۰ سال متوالی ترک سیگار کند، سابقه تاثیرگذار مصرف دخانیات در فرد برای ابتلا به بیماری کم می‌شود.

وی در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت این است که حتی قطع مصرف سیگار در زمان درمان باز هم کمک کننده به بهبود است، چرا که مصرف سیگار حین درمان اثر بخشی درمان را به شدت پایین آورده و کاهش می‌دهد.

این متخصص آنکولوژی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های سلامت به‌ویژه درخصوص سرطان بیان داشت: اگر به‌صورت اقتصادی سود تولید سیگار و مالیاتی که از تولید آن به‌دست می‌آید و بعد هزینه‌ای که تمام دولت‌ها در کشورهای مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای درمان سرطان انجام می‌دهند را بررسی کنیم متوجه می‌شویم دولت‌ها هزینه بالایی را برای تولید دخانیات پرداخت می‌کنند، گویی که آن‌ها برای ابتلا افراد به سرطان سوبسید پرداخت می‌کنند.



انسان بر اساس آرزوهایش دانش آموزی پس از وقت فراغت می تواند به خاطر ترسناک و گسترده ای بیشتر برقرار می ماند و فعالیت های سالم و سازنده را در اختیار داشته باشد...




سلامت دهان و دندان ایرانیان معطل افزایش ظرفیت دندانپزشکی

بی‌دندانی نیمی از ساکنان ایرانی در کمبود دندانپزشک و گرانای خدمات دندانپزشکی ریشه دارد.

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام اینکه مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان را در افراد بیشتر می کند، گفت: در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان ها، سابقه مصرف سیگار وجود دارد.

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است و هر ساله با افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی، شیوع آن در سراسر جهان رو به افزایش است. متخصصان اعلام کرده اند که مصرف سیگار و دخانیات شانس ابتلا به انواع سرطان ها را به شدت افزایش می دهد...

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است و هر ساله با افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی، شیوع آن در سراسر جهان رو به افزایش است. متخصصان اعلام کرده اند که مصرف سیگار و دخانیات شانس ابتلا به انواع سرطان ها را به شدت افزایش می دهد...



در ادامه به بررسی علل و عوامل خطر سرطان پرداخته می شود. تحقیقات نشان می دهد که علاوه بر سیگار، رژیم غذایی نامناسب و کم تحرکی نیز از عوامل مهم ابتلا به این بیماری هستند.

سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است و هر ساله با افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی، شیوع آن در سراسر جهان رو به افزایش است. متخصصان اعلام کرده اند که مصرف سیگار و دخانیات شانس ابتلا به انواع سرطان ها را به شدت افزایش می دهد...



روزنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۷ ذی القعدة ۱۴۴۳
سال بیست و چهارم - شماره ۶۴۹۹ - ۱۶ صفحه
قیمت: ۳۰۰۰ تومان

در این بخش به بررسی آخرین اخبار و رویدادها می پردازیم. از جمله برگزاری مراسم گرامی در تهران و افتتاح پروژه های مهم در سراسر کشور.

تمام مدارس دولتی پایتخت

تأمین و توزیع لوازم التحریر در مدارس دولتی پایتخت در جریان است. کارشناسان اعلام کرده اند که این کار با موفقیت انجام می شود و تمام مدارس در موعد مقرر به این لوازم مجهز خواهند شد.



تأمین و توزیع لوازم التحریر در مدارس دولتی پایتخت در جریان است. کارشناسان اعلام کرده اند که این کار با موفقیت انجام می شود و تمام مدارس در موعد مقرر به این لوازم مجهز خواهند شد.



در ادامه به بررسی علل و عوامل خطر سرطان پرداخته می شود. تحقیقات نشان می دهد که علاوه بر سیگار، رژیم غذایی نامناسب و کم تحرکی نیز از عوامل مهم ابتلا به این بیماری هستند.

آلبوم انتشار اخبار از دکتر حمیدرضا دهقان منشادی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری با موضوع:

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۰:۴۱

[فارس]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد مبتلایان به سرطان

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام اینکه مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از 30 درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۳:۳۱

[باشگاه خبرنگاران جوان]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی گفت: مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند؛ در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۴:۵۰

[صدا و سیما] ان

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی گفت: مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند؛ در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۱:۳۱

[دانشجو]

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی مطرح کرد:

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۱:۲۳

[جامجم آنلاین]

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی مطرح کرد:

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از ۳۰ درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۰۴:۰۵

[آریا]

سابقه مصرف سیگار در 30 درصد از مبتلایان به سرطان



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۳:۵۴
[سلامت نیوز]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از 30 درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۲:۴۴
[برنا]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از 30 درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۱:۵۱
[سینا]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی با اعلام این مهم که مصرف دخانیات شانس ابتلا به سرطان در افراد را بیشتر می‌کند، گفت: در بیش از 30 درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۱۳:۴۵
[بهار]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان



۱۴۰۱-۰۳-۱۶ ۲۱:۳۱
[روزنامه سپید]

سابقه مصرف سیگار در ۳۰ درصد از مبتلایان به سرطان

... «در بیش از 30 درصد افراد مبتلا به انواع سرطان‌ها سابقه مصرف سیگار وجود دارد.» به گزارش سپید، حمیدرضا دهقان **منشادی** با بیان ... در مصرف سیگار برسند، در این شرایط دور از انتظار نیست که ابتلا به سرطان در کشور طی سال‌های آینده افزایش پیدا کند. «**دهقان منشادی** ...

امروز ۰۹:۲۰
[خبرآنلاین]

بشنوید | با مصرف سیگار به کدام سرطان‌ها مبتلا می‌شوید؟


... یکی از عوامل تاثیرگذار در ابتلا به سرطان مصرف دخانیات است. در همین باره دکتر حمیدرضا دهقان **منشادی**، متخصص رادیوتراپی آنکولوژی معتقد است به‌طور متوسط 30 درصد افراد مبتلا به سرطان سابقه مصرف دخانیات ...



دیگر رسانه‌ها



تصویری : شبکه تلویزیونی خبرگزاری دانشجو



صوتی: خبرگزاری خبرآنلاین

